

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГРОЖАЮЩИХ ПРИЗНАКОВ У ПАЦИЕНТОВ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. КРИТЕРИИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Дистанционный учебный курс 06, 07, 08 мая 2020 года

Доктор Лора Гыцу

Ассистент, кафедра семейной медицины,
ГУМФ "Николае Тестемицану"



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare și Cooperare
Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству

Swiss TPH



Swiss Tropical and Public Health Institute
Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut
Institut Tropical et de Santé Publique Suisse

Associated Institute of the University of Basel



World Health
Organization



Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale
al Republicii Moldova



Proiect
Viața Sănătoasă
Reducerea poverii bolilor netransmisibile

УГРОЖАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

- Одышка в покое
- Затрудненное дыхание
- Боль в груди или давление
- Потная кожа
- Сонливость с трудностями пробуждения
- Цианотичное лицо или губы
- Олиго-анурия
- Кровохарканье



Versiunea 1.3 25 Martie 2020

Covid-19: Consultații la distanță

Un ghid rapid pentru evaluarea pacienților prin apel telefonic sau apel video

Ord. MSMPs Nr. 385 in 09.04.20 Cu privire la acordarea asistentei medicale a persoanelor care intrunesc criteriile definitiei de caz COVID-19 la etapa de transmitere comunitara a infectiei
*Ghid rapid pentru evaluarea pacienților prin apel telefonic sau video. COVID-19: Consultații la distanță.
Protocol terapeuț adulți Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof.Dr.Matei Balș»*



Atenție

Simptome alarmante:

Dispnee severă,
de repaus

Dificultăți de respirație

Dureri sau presiune
în piept

Piele transpirată

Somnolență cu
dificultate la trezire

Față și buze cianotice

Oligo/anurie

Hemoptizie

Alte afecțiuni:

Erupție persistentă

Rigiditate a gâtului



УГРОЖАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Другие условия

Постоянный зуд

Ригидность затылочной мышцы

thebmj Infografic



Versiunea 1.3 25 Martie 2020

Covid-19: Consultații la distanță

Un ghid rapid pentru evaluarea pacienților prin apel telefonic sau apel video

Ord. MSMPS Nr. 385 in 09.04.20 Cu privire la acordarea asistentei medicale a persoanelor care intrunesc criteriile definitiei de caz COVID-19 la etapa de transmitere comunitara a infectiei
Ghid rapid pentru evaluarea pacienților prin apel telefonic sau video. COVID-19: Consultații la distanță.
Protocol terapeut adulți Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof.Dr.Matei Balș»



Atenție

Simptome alarmante:

Dispnee severă,
de repaus

Dificultăți de respirație

Dureri sau presiune
în piept

Piele transpirată

Somnolență cu
dificultate la trezire

Față și buze cianotice

Oligo/anurie

Hemoptizie

Alte afecțiuni:

Erupție persistentă

Rigiditate a gâtului





Covid-19: Consultații la distanță

Un ghid rapid pentru evaluarea pacienților prin apel telefonic sau apel video



5 Examenul Fizic

Evaluați starea fizică și mentală cât de bine este posibil

În cazul conversației telefonice rugați pacientul sau aparținătorul să descrie:
statutul respirației
culoarea feței și a buzelor

În cazul conversației video îndreptați atenția către:
Comportamentul general
Culoarea pielii

Verificați capacitatea respiratorie – incapacitatea de a vorbi în propoziții complete sau întregi este cel mai adesea comun bolilor severe:

Cum respirați?

Este mai grav astăzi față de ziua precedentă?

Ce nu poți face din cauza dificultăților de respirație?

Dacă se află în posesia dispozitivelor necesare, pacientul poate verifica singur:

Temperatura | **Pulsul**
Tensiunea
Saturația de oxigen după posibilitate

Interpretați rezultatele monitorizărilor cu precauție ținând cont de context și evaluarea generală



Covid-19: Consultații la distanță

Un ghid rapid pentru evaluarea pacienților prin apel telefonic sau apel video



6 Decizii și acțiuni

Sfătuiți și programați verificări în funcție de disponibilitate și capacități.

Semne de vigilență pentru spitalizare

Temperatură > 38C°

Frecvența respirației <10 sau >25 pe min.

Puls >100 + stări de confuzie

Saturație de oxigen ≤94%

Tensiunea arterială sistolică <90 mmHg

Posibil COVID-19, stare generală bună, simptome ușoare:

Tratament la domiciliu, lichide, paracetamol conform PCS cu privire la COVID-19

Recomandare – completarea fișei de autoevaluare la domiciliu și informarea medicului de familie

Posibil COVID-19, stare generală afectată, în deteriorare:

Reevaluați starea de sănătate a pacientului peste 2-3 ore, monitorizați activ dacă suspectați pneumonie

Măsurile de siguranță (comunicați pacientului):

Dacă locuiți singur, informați medicul de familie și asistentul social

Mentțineți aportul de lichide la 6-8 pahare de 200 ml pe zi

Apelați la asistență de urgență dacă aveți simptome alarmante

Comorbidități relevante:

Spitalizați pacientul

Stare deteriorată, necesită internare:

Apelați
112

КРИТЕРИИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ЭТАП II:

- Действительно в течение периода, определенного Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, когда лечение начинается на дому! С 10 апреля 2020 года
- прогрессирующее ухудшение общего состояния
- затрудненное дыхание
 - лихорадка, устойчивая к лечению парацетамолом
 - (3 последовательных приема каждые 6 часов)

КРИТЕРИИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ


ЭТАП II:

■ Легкие и умеренные формы COVID-19 с серьезным риском ухудшения общего состояния:

- пациенты в возрасте 18-60 лет с сопутствующими патологиями:

сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ, диабет, иммунодефицитные состояния, онкологические заболевания;

- пациенты ≥ 60 лет;
- дети 0-17 лет 11 месяцев 29 дней;
- беременные женщины.



КРИТЕРИИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

- ЭТАП II:
Тяжелые / критические формы COVID-19
ЧД (частота дыхания) ≤ 10 или ≥ 25 в минуту;
САД (систолическое артериальное давление) ≤ 90 мм рт.
НКО₂ (насыщение крови кислородом) $\leq 95\%$.
Установка пневмонии, тяжелой бактериальной ко-инфекции.
Токсический шок.

Менингит, менингоэнцефалит:

- сильная головная боль;
- менингеальные признаки;
- тошнота, рвота

Отсутствие эпидемиологических условий для изоляции в домашних условиях.

РЕЖИМ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Пациенты, подозреваемые на COVID-19,
доставляются в больницу через Службу
неотложной медицинской помощи, звоните
по телефону **112!**